



漢方製剤

オースギ 漢方胃腸薬

(安中散エキス製剤)

第2類医薬品

特徴

オースギ漢方胃腸薬は、安中散（あんちゅうさん）という漢方薬のエキスを飲みやすい顆粒剤にしたものです。本剤は、ほっそりとしたやせ型で腹部や内臓の筋肉が弛緩傾向にある、いわゆる弛緩性体质の人で、神経質でときどき胃やミゾオチのあたりが痛んだり、食物が胃に停滞して消化が悪いと感じたり、胸やけ、げっぷ、食欲不振、はきけなどがときどきある人の諸症状に効果があります。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次のは服用しないでください。

生後3ヵ月未満の乳児。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

(1) 医師の治療を受けている人。

(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。

(3) 高齢者。

(4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

(5) 次の症状のある人。

むくみ

(6) 次の診断を受けた人。

高血圧、心臓病、腎臓病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。

その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能又は効果

体力中等度以下で、腹部は力がなくて、胃痛又は腹痛があって、ときに胸やけや、げっぷ、胃もたれ、食欲不振、はきけ、嘔吐などを伴うものの次の諸症：

神経性胃炎、慢性胃炎、胃腸虚弱

用法及び用量

次の量を食前または食間に、水またはお湯で服用してください。(食間とは食後2~3時間を持ちます)

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1包	3回
15歳未満7歳以上	2/3包	
7歳未満4歳以上	1/2包	
4歳未満2歳以上	1/3包	
2歳未満	1/4包	

<用法及び用量に関する注意>

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2) 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させてください。

成分及び分量

本剤3包(1包1.0g)中に、次の生薬から抽出された安中散エキス1.0gが含まれています。

ケイヒ(桂皮).....	4g	シユクシャ(縮砂).....	1g
エンゴサク(延胡索).....	3g	カンゾウ(甘草).....	1g
ボレイ(牡蠣).....	3g	リョウキョウ(良姜).....	0.5g
ウイキョウ(茴香).....	1.5g		

添加物として、乳糖、トウモロコシデンプン、ステアリン酸マグネシウムを含有しています。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない温氣の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4) 1包を分割して服用した残りは、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。

●本剤は天然の生薬を原料として製造していますので、製品の色や味等に多少の差異が生じることがあります。効果には変わりありません。

本剤についてのお問い合わせ先

大杉製薬株式会社 お客様相談室

〒545-0002 大阪市阿倍野区天王寺町南1-1-2

電話(06) 6629-0062

受付時間 10時から17時まで(土、日、祝日を除く)

大杉製薬株式会社

大阪市阿倍野区天王寺町南1-1-2