



漢方製剤

# ハイビナール

(辛夷清肺湯エキス製剤)

第2類医薬品

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に、読めるように大切に保管してください。

## 特 徴

ハイビナールは、辛夷清肺湯（しんいせいはいとう）という漢方薬のエキスを飲みやすい顆粒剤にしたものです。本剤は、鼻づまりや鼻粘膜の炎症、化膿を取り除いて鼻の機能を正常に戻し、呼吸する空気をきれいにすると肺も清くなる、として用いられた漢方薬です。鼻づまりを通して、鼻病に伴ううっとおしい気分をはらいのけ、うつ熱をさまして炎症を鎮め、鼻づまりや慢性になった鼻炎、副鼻腔炎（ちくのう症）に効果をあらわします。



### 使用上の注意



#### してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

次の人は服用しないでください。

生後3ヵ月未満の乳児。



#### 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - 医師の治療を受けている人。
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
  - 胃腸虚弱で冷え症の人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
消化器	食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のたるさ、食欲不振等があらわれる。
腸間膜静脈硬化症	長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれる。

- 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- \* 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

### 効能又は効果

体力中等度以上で、濃い鼻汁が出て、ときに熱感を伴うものの次の諸症：

鼻づまり、慢性鼻炎、蓄膿症（副鼻腔炎）

### 用法及び用量

次の量を食前または食間に、水またはお湯で服用してください。（食間とは食後2～3時間を指します）

年 齢	1 回 量	1日服用回数
成人（15歳以上）	1包	3 回
15歳未満7歳以上	$\frac{2}{3}$ 包	
7歳未満4歳以上	$\frac{1}{2}$ 包	
4歳未満2歳以上	$\frac{1}{3}$ 包	
2歳未満	$\frac{1}{4}$ 包	

#### <用法及び用量に関連する注意>

- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合のみ服用させてください。

### 成分及び分量

本剤3包（1包4.0g）中に、次の生薬から抽出された辛夷清肺湯エキス6.3gが含まれています。

シンイ（辛夷）……………2g	ハクモンドウ（麦門冬）……………5g
チモ（知母）……………3g	セッコウ（石膏）……………5g
ビャクゴウ（百合）……………3g	ショウマ（升麻）……………1g
オウゴン（黄芩）……………3g	ピウヨウ（枇杷葉）……………2g
サンシシ（山梔子）……………3g	

添加物として、乳糖、トウモロコシデンプン、ステアリン酸マグネシウムを含有しています。

### 保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります）
- 1包を分割して服用した残りは、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。

●本剤は天然の生薬を原料として製造していますので、製品の色や味等に多少の差異が生じることがあります。効果には変わりありません。

### 本剤についてのお問い合わせ先

大杉製薬株式会社 医薬情報部  
〒546-0035 大阪市東住吉区山坂1-8-6  
電話（06）6629-9058  
受付時間 10時から17時まで（土、日、祝日を除く）

大杉製薬株式会社

大阪市阿倍野区天王寺町南1-1-2