



漢方製剤

# オスギコーミン

(黄連解毒湯エキス製剤)

第2類医薬品

## 特 徴

オスギコーミンは、黄連解毒湯（おうれんげどくとう）という漢方薬のエキスを飲みやすい顆粒剤にしたものです。比較的がっしりとして体力があり、赤ら顔でのぼせやすく、イライラする傾向の人に適しています。それは配合された4つの構成生薬により、熱を冷まし、いらだつ神経を鎮めて、循環障害や代謝障害による充血と炎症をとり、気を鎮め、うっ血を散じ、血のめぐりをよくするために、イライラや不眠、湿疹・皮膚炎、皮膚のかゆみ、血の道症、そのほか胃炎、二日酔などの症状に効果があります。



## 使用上の注意



### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の人は服用しないでください。

生後3ヵ月未満の乳児。



### 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - 医師の治療を受けている人。
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりと息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腸間膜静脈硬化症	長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれる。

(下線 \_\_\_\_\_ 改訂箇所)

- 1ヵ月位(鼻出血、二日酔に服用する場合には5~6回)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## 効能又は効果

体力中等度以上で、のぼせがみで顔色赤く、いらいらして落ち着かない傾向のあるものの次の諸症：

鼻出血、不眠症、神経症、胃炎、二日酔、血の道症<sup>注)</sup>、めまい、動悸、更年期障害、湿疹・皮膚炎、皮膚のかゆみ、口内炎

注) 血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちの精神神経症状および身体症状のことである。

## 用法及び用量

次の量を食前または食間に、水またはお湯で服用してください。(食間とは食後2~3時間を指します)

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
成人(15歳以上)	1包	3 回
15歳未満7歳以上	2/3包	
7歳未満4歳以上	1/2包	
4歳未満2歳以上	1/3包	
2歳未満	1/4包	

### <用法及び用量に関連する注意>

- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させてください。

## 成分及び分量

本剤3包(1包1.5g)中に、次の生薬から抽出された黄連解毒湯エキス1.7gが含まれています。

オウレン(黄連).....1.5g	オウゴン(黄芩).....3g
オウバク(黄柏).....3g	サンシシ(山梔子).....3g

添加物として、乳糖、トウモロコシデンプン、ステアリン酸マグネシウムを含有しています。

## 保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- 1包を分割して服用した残りは、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。

●本剤は天然の生薬を原料として製造していますので、製品の色や味等に多少の差異が生じることがあります。効果には変わりありません。

## 本剤についてのお問い合わせ先

大杉製薬株式会社 お客様相談室  
〒545-0002 大阪市阿倍野区天王寺町南1-1-2  
電話 (06) 6629-0062  
受付時間 10時から17時まで(土、日、祝日を除く)

大杉製薬株式会社

大阪市阿倍野区天王寺町南1-1-2