



漢方製剤

五苓散料A

（五苓散エキス製剤）

第2類医薬品

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に、読めるように大切に保管してください。

特 徴

五苓散料Aは、五苓散（ごれいさん）という漢方薬のエキスを飲みやすい顆粒剤にしたものです。本剤は、体内の水分代謝がうまくいかなくなり、むかついたり、食欲がなくなったり、のどがかわいて、水を飲んでも尿の出が悪く、体がむくむなどの症状をとり、消化器系や腎臓排泄系の働きをよくして体のバランスを整えるお薬で、水様性下痢、急性胃腸炎、暑気あたり、頭痛、むくみ、二日酔などによく効きます。



使用上の注意



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

次の人は服用しないでください。
生後3ヵ月未満の乳児。



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- 1ヵ月位（急性胃腸炎、二日酔に服用する場合には5～6回、水様性下痢、暑気あたりに服用する場合には5～6日間）服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能又は効果

体力に関わらず使用でき、のどが渇いて尿量が少ないもので、めまい、はきけ、嘔吐、腹痛、頭痛、むくみなどのいずれかを伴う次の諸症：

水様性下痢、急性胃腸炎（しぶり腹^注）のものには使用しないこと、暑気あたり、頭痛、むくみ、二日酔

<効能又は効果に関連する注意>

注）しぶり腹とは、残便感があり、くり返し腹痛を伴う便意を催すもののことである。

用法及び用量

次の量を食前または食間に、水またはお湯で服用してください。（食間とは食後2～3時間を指します）

年 齢	1 回 量	1日服用回数
成人（15歳以上）	1包	3 回
15歳未満7歳以上	$\frac{2}{3}$ 包	
7歳未満4歳以上	$\frac{1}{2}$ 包	
4歳未満2歳以上	$\frac{1}{3}$ 包	
2歳未満	$\frac{1}{4}$ 包	

<用法及び用量に関連する注意>

- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させてください。

成分及び分量

本剤3包（1包1.5g）中に、次の生薬から抽出された五苓散エキス2.1gが含まれています。

タクシャ（沢瀉）	6g	ソウジュツ（蒼朮）	4.5g
チョレイ（猪苓）	4.5g	ケイヒ（桂皮）	3g
ブクリョウ（茯苓）	4.5g		

添加物として、乳糖、トウモロコシデンプン、ステアリン酸マグネシウムを含有しています。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります）
- 1包を分割して服用した残りは、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。

●本剤は天然の生薬を原料として製造していますので、製品の色や味等に多少の差異が生じることがあります。効果には変わりありません。

本剤についてのお問い合わせ先

大杉製薬株式会社 お客様相談室
〒545-0002 大阪市阿倍野区天王寺町南1-1-2
電話（06）6629-0062
受付時間 10時から17時まで（土、日、祝日を除く）

大杉製薬株式会社

大阪市阿倍野区天王寺町南1-1-2