



漢方製剤

モリ エーシャン

(当帰芍薬散エキス製剤)

第2類医薬品

特 徴

モリ エーシャンは、当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん)という漢方薬のエキスを飲みやすい顆粒剤にしたものです。本剤は、色白できゃしゃな体つきで、疲れやすく、体力のない人に適したお薬で、冷え症や貧血の傾向があったり、ときどき下腹が痛んだり、立ちくらみ、肩こり、頭重、耳鳴り、どうきなどのある症状に、すぐれた効果があります。



使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 胃腸の弱い人。
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振・胃部不快感

- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能又は効果

体力虚弱で、冷え症で貧血の傾向があり疲労しやすく、ときに下腹部痛、頭重、めまい、肩こり、耳鳴り、動悸などを訴えるものの次の諸症：

月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、産前産後あるいは流産による障害(貧血、疲労倦怠、めまい、むくみ)、めまい・立ちくらみ、頭重、肩こり、腰痛、足腰の冷え症、しもやけ、むくみ、しみ、耳鳴り

用法及び用量

次の量を食前または食間に、水またはお湯で服用してください。

(食間とは食後2～3時間を指します)

年 齢	1 回 量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1包	3 回
15歳未満7歳以上	$\frac{2}{3}$ 包	
7歳未満4歳以上	$\frac{1}{2}$ 包	
4歳未満	服用しないこと	

<用法及び用量に関連する注意>

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分及び分量

本剤3包(1包2.5g)中に、次の生薬から抽出された当帰芍薬散エキス4.2gが含まれています。

トウキ(当帰)……………3g	ブクリョウ(茯苓)……………4g
センキュウ(川芎)……………3g	ビャクジュツ(白朮)……………4g
シャクヤク(芍薬)……………4g	タクシャ(沢瀉)……………4g

添加物として、乳糖、トウモロコシデンプン、ステアリン酸マグネシウムを含有しています。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- 1包を分割して服用した残りは、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。

●本剤は天然の生薬を原料として製造していますので、製品の色や味等に多少の差異が生じることがあります。効果には変わりありません。

本剤についてのお問い合わせ先

大杉製薬株式会社 お客様相談室
〒545-0002 大阪市阿倍野区天王寺町南1-1-2
電話(06)6629-0062
受付時間 10時から17時まで(土、日、祝日を除く)

大杉製薬株式会社

大阪市阿倍野区天王寺町南1-1-2