



漢方製剤

# モリ エーポン

(補中益気湯エキス製剤)

第2類医薬品

## 特 徴

モリ エーポンは、補中益気湯(ほちゅうえっきとう)という漢方薬のエキスを飲みやすい顆粒剤にしたものです。本剤は、胃腸の働きを活発にして食欲を増し、消化吸収力を高め、それにより新陳代謝をさかんにして疲れをとり、体を元気づける働きがあります。元気がない人、疲れやすい虚弱体質の人、病後や術後などで手足がだるく、疲労感が強く、汗かきで食欲不振の人に効きめがあります。



### 使用上の注意



#### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の人は服用しないでください。

生後3ヵ月未満の乳児。



#### 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - 医師の治療を受けている人。
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - 高齢者。
  - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
  - 次の症状のある人。  
むくみ
  - 次の診断を受けた人。  
高血圧、心臓病、腎臓病
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

- 1ヵ月位(感冒に服用する場合には5~6日間)服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

#### 効能又は効果

体力虚弱で、元気がなく、胃腸のはたらきが衰えて、疲れやすいものの次の諸症：  
虚弱体質、疲労倦怠、病後・術後の衰弱、食欲不振、ねあせ、感冒

#### 用法及び用量

次の量を食前または食間に、水またはお湯で服用してください。(食間とは食後2~3時間を指します)

年 齢	1 回 量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1包	3 回
15歳未満7歳以上	2/3包	
7歳未満4歳以上	1/2包	
4歳未満2歳以上	1/3包	
2歳未満	1/4包以下	

#### <用法及び用量に関連する注意>

- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合のみ服用させてください。

#### 成分及び分量

本剤3包(1包4.0g)中に、次の生薬から抽出された補中益気湯エキス6.2gが含まれています。

オウギ(黄耆).....4g	ショウキョウ(生姜).....0.5g
ニンジン(人参).....4g	タイソウ(大棗).....2g
ビャクジュツ(白朮).....4g	サイコ(柴胡).....2g
トウキ(当帰).....3g	カンソウ(甘草).....1.5g
チンピ(陳皮).....2g	ショウマ(升麻).....1g

添加物として、乳糖、トウモロコシデンプン、ステアリン酸マグネシウムを含有しています。

#### 保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- 1包を分割して服用した残りは、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。

- 本剤は天然の生薬を原料として製造していますので、製品の色や味等に多少の差異が生じることがあります。効果には変わりありません。

#### 本剤についてのお問い合わせ先

大杉製薬株式会社 お客様相談室  
〒545-0002 大阪市阿倍野区天王寺町南1-1-2  
電話(06)6629-0062  
受付時間 10時から17時まで(土、日、祝日を除く)

## 大杉製薬株式会社

大阪市阿倍野区天王寺町南1-1-2