



漢方製剤

モリ コーミョウ

(七物降下湯エキス製剤)

第2類医薬品

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に、読めるように大切に保管してください。

特 徴

モリ コーミョウは、七物降下湯(しちもつこうかとう)という漢方薬のエキスを飲みやすい顆粒剤にしたものです。本剤は、体が虚弱な傾向の人に適し、そのような人の高血圧に伴うのぼせ、肩こり、頭重、耳なり等の随伴症状に効果があります。



使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 胃腸が弱く下痢しやすい人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	食欲不振・胃部不快感

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
下痢
- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- 1包を分割して服用した残りは、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。

- 本剤は天然の生薬を原料として製造していますので、製品の色や味等に多少の差異が生じることがあります。効果には変わりありません。

効能又は効果

体力中等度以下で、顔色が悪くて疲れやすく、胃腸障害のないものの次の諸症：
高血圧に伴う随伴症状(のぼせ、肩こり、耳なり、頭重)

用法及び用量

次の量を食前または食間に、水またはお湯で服用してください。
(食間とは食後2～3時間を指します)

年 齢	1 回 量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1包	3回
15歳未満の小児	服用しないこと	

成分及び分量

本剤3包(1包2.5g)中に、次の生薬から抽出された七物降下湯エキス4.3gが含まれています。

トウキ(当帰)……………3g	チョウトウコウ(釣藤鉤)……4g
シャクヤク(芍薬)……………3g	オウギ(黄耆)……………3g
センキュウ(川芎)……………3g	オウバク(黄柏)……………2g
ジオウ(地黄)……………3g	

添加物として、乳糖、トウモロコシデンプン、ステアリン酸マグネシウムを含有しています。

本剤についてのお問い合わせ先

大杉製薬株式会社 お客様相談室
〒545-0002 大阪市阿倍野区天王寺町南1-1-2
電話(06)6629-0062
受付時間 10時から17時まで(土、日、祝日を除く)

大杉製薬株式会社

大阪市阿倍野区天王寺町南1-1-2