



服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に、読めるように大切に保管してください。

漢方製剤

# ジュホトウ

(十全大補湯エキス製剤)

第2類医薬品

## 特 徴

ジュホトウは、十全大補湯（じゅうぜんたいほうとう）という漢方薬のエキスを飲みやすい顆粒剤にしたものです。本剤は、手術の後や病気で体力が低下したとき、体が疲れてひどいだるさを感じたとき、疲れや胃腸の働きが悪くなって食欲が低下したとき、手足が冷えたとき、ねあせ、貧血にすぐれた効きめがあります。



## 使用上の注意



### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の人は服用しないでください。  
生後3ヵ月未満の乳児。



### 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - 医師の治療を受けている人
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人
  - 胃腸の弱い人
  - 高齢者
  - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
  - 次の症状のある人、  
むくみ
  - 次の診断を受けた人、  
高血圧、心臓病、腎臓病

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。  
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
下痢
- 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## 効能又は効果

体力虚弱なもの次の諸症：  
病後・術後の体力低下、疲労倦怠、食欲不振、ねあせ、手足の冷え、貧血

## 用法及び用量

次の量を食前または食間に、水またはお湯で服用してください。  
(食間とは食後2～3時間を指します)

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
成人（15歳以上）	1 包	3 回
15歳未満7歳以上	1/2包	
7歳未満4歳以上	1/3包	
4歳未満2歳以上	1/4包	
2歳未満	1/6包	

## <用法及び用量に関連する注意>

- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させてください。

## 成分及び分量

本剤3包（1包4.0g）中に、次の生薬から抽出された十全大補湯エキス6.1gが含まれています。

ニンジン（人参）……………3g	ジオウ（地黄）……………3g
オウギ（黄耆）……………3g	センキュウ（川芎）……………3g
ビャクシュツ（白朮）……………3g	シャクヤク（芍薬）……………3g
トウキ（当帰）……………3g	ケイヒ（桂皮）……………3g
ブクリョウ（茯苓）……………3g	カンソウ（甘草）……………1.5g

添加物として、乳糖、トウモロコシデンプン、ステアリン酸マグネシウムを含有しています。

## 保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります）
- 1包を分割して服用した残りは、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。

●本剤は天然の生薬を原料として製造していますので、製品の色や味等に多少の差異が生じることがあります。効果には変わりありません。

## 本剤についてのお問い合わせ先

大杉製薬株式会社 医薬情報部  
〒546-0035 大阪市東住吉区山坂1-8-6  
電話（06）6629-9058  
受付時間 10時から17時まで（土、日、祝日を除く）

## 大杉製薬株式会社

大阪市阿倍野区天王寺町南1-1-2