

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に、読めるように大切に保管してください。



漢方製剤

モリカッコミン

(防風通聖散エキス製剤)

第2類医薬品

特 徴

モリカッコミンは、防風通聖散（ぼうふうつうしょうさん）という漢方薬のエキスを飲みやすい顆粒剤にしたものです。本剤は、脂肪太りの人で、とくにお腹のまわりに固く皮下脂肪がたくさんつき、日頃は丈夫で活動的、それに便秘がちな人の肥満に適しています。本剤の服用で、肥満症、むくみ、便秘や高血圧に伴う動悸、肩こり、のぼせがよくなり、湿疹・皮膚炎、にきびなどのふきでものにも効果があります。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。
他の瀉下薬（下剤）
2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人、
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人、
 - (3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）、
 - (4) 胃腸が弱く下痢しやすい人、
 - (5) 発汗傾向の著しい人、
 - (6) 高齢者、
 - (7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人、
 - (8) 次の症状のある人、
むくみ、排尿困難
 - (9) 次の診断を受けた人、
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、腹部膨満、はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛
精神神経系	めまい
そ の 他	発汗、動悸、むくみ、頭痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
下痢、便秘
4. 1ヵ月位（便秘に服用する場合には1週間位）服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
5. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能又は効果

体力充実して、腹部に皮下脂肪が多く、便秘がちなもの次の諸症：
高血圧や肥満に伴う動悸・肩こり・のぼせ・むくみ・便秘、蓄膿症（副鼻腔炎）、湿疹・皮膚炎、ふきでもの（にきび）、肥満症

用法及び用量

次の量を食前または食間に、水またはお湯で服用してください。

（食間とは食後2～3時間を指します）

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
成人（15歳以上）	1 包	3 回
15歳未満の小児	服用しないこと	

成分及び分量

本剤3包（1包3.0g）中に、次の生薬から抽出された防風通聖散エキス5.2gが含まれています。

トウキ（当帰）……………1.2g	マオウ（麻黄）……………1.2g
シャクヤク（芍薬）……………1.2g	ダイオウ（大黄）……………1.5g
センキュウ（川芎）……………1.2g	ボウショウ（芒硝）……………0.7g
サンシシ（山梔子）……………1.2g	ビャクジュツ（白朮）……………2.0g
レンギョウ（連翹）……………1.2g	キキョウ（桔梗）……………2.0g
ハッカ（薄荷）……………1.2g	オウゴン（黄芩）……………2.0g
ショウキョウ（生姜）……………0.3g	セッコウ（石膏）……………2.0g
ケイガイ（荊芥）……………1.2g	カンゾウ（甘草）……………2.0g
ボウフウ（防風）……………1.2g	カッセキ（滑石）……………3.0g

添加物として、乳糖、トウモロコシデンプン、ステアリン酸マグネシウムを含有しています。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります）
- (4) 1包を分割して服用した残りは、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。

●本剤は天然の生薬を原料として製造していますので、製品の色や味等に多少の差異が生じることがあります。効果には変わりありません。

本剤についてのお問い合わせ先

大杉製薬株式会社 お客様相談室
〒545-0002 大阪市阿倍野区天王寺町南1-1-2
電話（06）6629-0062
受付時間 10時から17時まで（土、日、祝日を除く）

大杉製薬株式会社

大阪市阿倍野区天王寺町南1-1-2