



服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に、読めるように大切に保管してください。

漢方製剤

# ダイカーン

（大黃甘草湯エキス製剤）

第2類医薬品

## 特 徴

ダイカーンは、大黃甘草湯（だいおうかんそうとう）という漢方薬のエキスを飲みやすい顆粒剤にしたものです。本剤は、体力にかかわらず使用でき、便秘や便秘に伴う頭重・湿疹・皮膚炎・ふきでもの（にきび）・腸内異常発酵・痔などの症状に効きめがあります。



### 使用上の注意



#### してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

- 次の人は服用しないでください。  
生後3ヵ月未満の乳児。
- 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。  
他の瀉下薬（下剤）
- 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。



#### 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - 医師の治療を受けている人。
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
  - 胃腸が弱く下痢しやすい人。
  - 高齢者。
  - 次の症状のある人。  
むくみ
  - 次の診断を受けた人。  
高血圧、心臓病、腎臓病
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症 状            |
|------|----------------|
| 消化器  | はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛 |

まれに下記のような重篤な症状が起こることがあります。  
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称           | 症 状   |
|-----------------|---|
| 偽アルドステロン症、ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。 |

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
下痢
- 5～6日間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

### 効能又は効果

便秘、便秘に伴う頭重・のぼせ・湿疹・皮膚炎・ふきでもの（にきび）・食欲不振（食欲減退）・腹部膨満・腸内異常発酵・痔などの症状の緩和

<効能又は効果に関連する注意>

注）体力に関わらず、使用できる。

### 用法及び用量

次の量を食前または食間に、水またはお湯で服用してください。（食間とは食後2～3時間を指します）

| 年 齢       | 1 回 量           | 1 日服用回数 |
|-----------|-----------------|---------|
| 成人（15歳以上） | 1 包             | 3 回     |
| 15歳未満7歳以上 | $\frac{2}{3}$ 包 |         |
| 7歳未満4歳以上  | $\frac{1}{2}$ 包 |         |
| 4歳未満2歳以上  | $\frac{1}{3}$ 包 |         |
| 2歳未満      | $\frac{1}{4}$ 包 |         |

<用法及び用量に関連する注意>

- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合のみ服用させてください。

### 成分及び分量

本剤3包（1包1.0g）中に、次の生薬から抽出された大黃甘草湯エキス0.8gが含まれています。

|          |    |
|----------|----|
| ダイオウ（大黃） | 4g |
| カンゾウ（甘草） | 1g |

添加物として、乳糖、トウモロコシデンプン、ステアリン酸マグネシウムを含有しています。

### 保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります）
- 1包を分割して服用した残りは、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。

●本剤は天然の生薬を原料として製造していますので、製品の色や味等に多少の差異が生じることがあります。効果には変わりありません。

### 本剤についてのお問い合わせ先

大杉製薬株式会社 お客様相談室  
〒545-0002 大阪市阿倍野区天王寺町南1-1-2  
電話（06）6629-0062  
受付時間 10時から17時まで（土、日、祝日を除く）

## 大杉製薬株式会社

大阪市阿倍野区天王寺町南1-1-2