

漢方製剤

オースギ

SG-140

四 苓 湯

細粒（調剤用）

し れい と う
(四苓湯)

貯法：室温保存
有効期間：3年

承認番号	15400AMZ01607000
販売開始	1981年9月

3. 組成・性状

3.1 組成

販売名	オースギ四苓湯細粒（調剤用）	
有効成分	本剤は1日量3.0g中、下記の生薬末を含有する。	
	日局 タクシャ末	0.75g
	日局 ブクリョウ末	0.75g
	日局 ソウジュツ末	0.75g
	日局 チョレイ末	0.75g

3.2 製剤の性状

剤形	細粒剤
色調	暗褐色～灰褐色
におい	特異なにおい
味	やや苦い
識別コード	S G - 1 4 0

4. 効能又は効果

のどが渇いて水を飲んでも尿量が少なく、はき気、嘔吐、腹痛、むくみなどのいずれかを伴う次の諸症：
暑気あたり、急性胃腸炎、むくみ

6. 用法及び用量

成人1回1.0g、15歳未満7歳以上1回成人の2/3量、7歳未満4歳以上1回成人の1/2量、4歳未満2歳以上1回成人の1/3量、2歳未満1回成人の1/4量、いずれも1日3回食前または食間に水または白湯にて経口投与する。

8. 重要な基本的注意

- 8.1 本剤の使用にあたっては、患者の証（体質・症状）を考慮して投与すること。なお、経過を十分に観察し、症状・所見の改善が認められない場合には、継続投与を避けること。
- 8.2 他の漢方製剤等を併用する場合は、含有生薬の重複に注意すること。

9. 特定の背景を有する患者に関する注意

9.5 妊婦

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。

9.6 授乳婦

治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。

9.7 小児等

小児等を対象とした臨床試験は実施していない。

9.8 高齢者

減量するなど注意すること。一般に生理機能が低下している。

20. 取扱い上の注意

- 20.1 本剤の品質を保つため、できるだけ湿気を避け、直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- 20.2 開封後は特に湿気を避け、取扱いに注意すること。
- 20.3 本剤は生薬を原料としているので、色調等が異なることがある。

22. 包装

500g [ボトル]
294g (1.0g×294包) [分包]
84g (1.0g×84包) [分包]

24. 文献請求先及び問い合わせ先

大杉製薬株式会社 医薬情報部
〒546-0035 大阪市東住吉区山坂1-8-6
TEL 06-6629-9058 FAX 06-6629-9070
HP <https://ohsugi-kanpo.co.jp/>

26. 製造販売業者等

26.1 製造販売元

大杉製薬株式会社
大阪市阿倍野区天王寺町南1-1-2