

## 生薬製剤

劇薬

SG-205

日本薬局方  
加工ブシ末

(オースギ加工ブシ末)

貯法：室温保存

有効期間：3年

承認番号	21000AMZ00583000
販売開始	1999年7月

## 3. 組成・性状

## 3.1 組成

販売名	オースギ加工ブシ末
有効成分	本剤はハナトリカブト又はオクトリカブトの塊根を高圧蒸気処理により毒性を減じた後（ブシ末1）、粉末とし、一定のアルカロイド量を含むようにトウモロコシデンブンで調整したものである。 本剤は、総アルカロイド〔ベンゾイルアコニン（ $C_{32}H_{45}NO_{10}$ ：603.70）として〕0.4～1.2%を含む。
添加剤	トウモロコシデンブン

## 3.2 製剤の性状

剤形	粉末
色調	淡褐色
におい	特異なにおい
識別コード	SG-205

## 4. 効能又は効果

漢方処方調剤に用いる。

## 6. 用法及び用量

漢方処方調剤に用いる。

## 9. 特定の背景を有する患者に関する注意

## 9.1 合併症・既往歴等のある患者

## 9.1.1 体力の充実している患者

副作用があらわれやすくなり、その症状が増強されるおそれがある。

## 9.1.2 暑がり、のぼせが強く、赤ら顔の患者

心悸亢進、のぼせ、舌のしびれ、悪心等があらわれるおそれがある。

## 11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

## 11.2 その他の副作用

	頻度不明
その他	心悸亢進、のぼせ、舌のしびれ、悪心等

## 20. 取扱い上の注意

- 20.1 本剤の品質を保つため、できるだけ湿気を避け、直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- 20.2 開封後は特に湿気を避け、取扱いに注意すること。
- 20.3 本剤は生薬を原料としているので、色調等が異なることがある。

## 22. 包装

- 100g [ボトル]  
500g [ボトル、乾燥剤入り]

## 24. 文献請求先及び問い合わせ先

大杉製薬株式会社 医薬情報部  
〒546-0035 大阪市東住吉区山坂 1-8-6  
TEL 06-6629-9058 FAX 06-6629-9070  
HP <https://ohsugi-kanpo.co.jp/>

## 26. 製造販売業者等

## 26.1 製造販売元

高砂薬業株式会社  
大阪市阿倍野区天王寺町南 2-1-20

## 26.2 発売元

大杉製薬株式会社  
大阪市阿倍野区天王寺町南 1-1-2