

漢方製剤

SG-25

オースギ
桂枝茯苓丸料
エキスG

けい し ぶくりょうがん

(桂枝茯苓丸)

貯法：室温保存

有効期間：3年

承認番号	16100AMZ03869000
販売開始	1986年10月

3. 組成・性状

3.1 組成

販売名	オースギ桂枝茯苓丸料エキスG			
有効成分	本剤は1日量4.5g中、下記生薬より抽出した水製乾燥エキス（桂枝茯苓丸料エキス）2.0gを含有する。			
	日局 ケイヒ	4g	日局 トウニン	4g
	日局 ブクリョウ	4g	日局 シャクヤク	4g
	日局 ボタンピ	4g		
添加剤	乳糖水和物、トウモロコシデンプン、ステアリン酸マグネシウム			

3.2 製剤の性状

剤形	顆粒剤
色調	淡灰茶褐色
におい	わずかなにおい
味	初めやや甘く、後苦い
識別コード	S G - 2 5

4. 効能又は効果

比較的体力があり、ときに下腹部痛、肩こり、頭重、めまい、のぼせて足冷えなどを訴える次の諸症：

月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、血の道症、肩こり、めまい、頭重、打ち身（打撲症）、しもやけ、しみ

6. 用法及び用量

通常、成人1日4.5gを2～3回に分割し、食前又は食間に経口投与する。なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。

8. 重要な基本的注意

8.1 本剤の使用にあたっては、患者の証（体質・症状）を考慮して投与すること。なお、経過を十分に観察し、症状・所見の改善が認められない場合には、継続投与を避けること。

8.2 他の漢方製剤等を併用する場合は、含有生薬の重複に注意すること。

9. 特定の背景を有する患者に関する注意

9.1 合併症・既往歴等のある患者

9.1.1 著しく体力の衰えている患者

副作用があらわれやすくなり、その症状が増強されるおそれがある。

9.5 妊婦

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には投与しないことが望ましい。本剤に含まれるトウニン、ボタンピにより流産の危険性がある。

9.6 授乳婦

治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。

9.7 小児等

小児等を対象とした臨床試験は実施していない。

9.8 高齢者

減量するなど注意すること。一般に生理機能が低下している。

11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

11.1 重大な副作用

11.1.1 肝機能障害、黄疸（いずれも頻度不明）

AST、ALT、Al-P、 γ -GTP等の著しい上昇を伴う肝機能障害、黄疸があらわれることがある。

11.2 その他の副作用

	頻度不明
過敏症	発疹、発赤、瘙痒等
消化器	食欲不振、胃部不快感、悪心、下痢等

20. 取扱い上の注意

20.1 本剤の品質を保つため、できるだけ湿気を避け、直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。

20.2 開封後は特に湿気を避け、取扱いに注意すること。

20.3 本剤は生薬を原料としているので、色調等が異なることがある。

22. 包装

500g [ボトル]

441g (1.5g×294包) [分包]

126g (1.5g×84包) [分包]

24. 文献請求先及び問い合わせ先

大杉製薬株式会社 医薬情報部

〒546-0035 大阪市東住吉区山坂1-8-6

TEL 06-6629-9058 FAX 06-6629-9070

HP <https://ohsugi-kanpo.co.jp/>

26. 製造販売業者等

26.1 製造販売元

大杉製薬株式会社

大阪市阿倍野区天王寺町南1-1-2