

漢方製剤



ジュンコウ
五苓散料

**承認番号	16100AMY00365000
薬価収載	1986年10月
販売開始	1986年10月

FCエキス細粒 医療用

(五 苓 散)

貯法：室温保存
「取扱い上の注意」
の項参照
使用期限：外箱に表示

【組成・性状】

** (1) 本剤は1日量4.5g中、下記生薬より抽出した水製乾燥エキス(五苓散料エキス)2.25gを含有する。

日局	タクシャ	6g	日局	ビャクジュツ	4.5g
日局	チョレイ	4.5g	日局	ケイヒ	3g
日局	ブクリョウ	4.5g			

添加物として、トウモロコシデンプン、乳糖水和物を含有する。

(2) 本剤は灰褐色の細粒で、特異なおいがあり、味はわずかに苦い。

識別コード：FC 17

【効能又は効果】

のどが渇いて、尿量が少なく、はきけ、嘔吐、腹痛、頭痛、むくみなどのいずれかを伴うものの次の諸症：水瀉性下痢、急性胃腸炎（しぶり腹のものには使用しないこと）、暑気あたり、頭重、むくみ

【用法及び用量】

通常、成人1日4.5gを2～3回に分割し、食前又は食間に経口投与する。なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。

【使用上の注意】

(1) 重要な基本的注意

- 1) 本剤の使用にあたっては、患者の証（体質・症状）を考慮して投与すること。なお、経過を十分に観察し、症状・所見の改善が認められない場合には、継続投与を避けること。
- 2) 他の漢方製剤等を併用する場合は、含有生薬の重複に注意すること。

(2) 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していないため、発現頻度は不明である。

	頻度不明
過敏症 ^{注1)}	発疹、発赤、瘙痒等
* 肝臓	肝機能異常(AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP等の上昇)

注1) このような症状があらわれた場合には投与を中止すること。

(3) 高齢者への投与

一般に高齢者では生理機能が低下しているので減量するなど注意すること。

(4) 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

妊娠中の投与に関する安全性は確立していないので、妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合のみ投与すること。

(5) 小児等への投与

小児等に対する安全性は確立していない。〔使用経験が少ない〕

【取扱い上の注意】

- ・直射日光を避け、湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- ・本剤は天然の生薬を原料としていますので、色や味等に多少の差異を生じることがありますが、効果に変わりありません。

【包装】

126g (1.5g × 84包)

【文献請求先】 (お問い合わせ先)

大杉製薬株式会社 医薬情報部

〒546-0035 大阪市東住吉区山坂1-8-6

TEL 050-3776-0358

製造販売元

康和薬通有限会社

大阪府柏原市円明町1000-37

発売元

大杉製薬株式会社

大阪市阿倍野区天王寺町南1-1-2