

## 漢方製剤

## 劇薬

承認番号	(61AM)第3611号
薬価収載	1986年10月
販売開始	1986年11月

## 三和 芍薬甘草附子湯エキス細粒

しゃくやくかんぞうぶしとう  
(芍薬甘草附子湯)

貯法：室温保存  
「取扱上の注意」  
の項参照  
使用期限：容器又は外箱に表示

## [禁忌(次の患者には投与しないこと)]

- 1) アルドステロン症の患者
  - 2) ミオパチーのある患者
  - 3) 低カリウム血症のある患者
- 〔1)～3)：これらの疾患及び症状が悪化するおそれがある。〕

## [組成・性状]

- 1) 本品1日量(4.5g)中、下記の芍薬甘草附子湯水煎エキス2.6gを含有する。  
〔日局 シャクヤク 5.0g 日局 ブ シ 1.0g〕  
〔日局 カンゾウ 5.0g〕  
添加物として乳糖水和物、トウモロコシデンプン、結晶セルロース、部分アルファー化デンプン、軽質無水ケイ酸を含有する。
- 2) 本品は褐色の細粒で、特異な芳香を有し、味は甘く、やや苦い。

## [効能又は効果]

冷症で関節や筋肉が痛み、麻痺感があって四肢の屈伸が困難なものの次の諸症

慢性神経痛、慢性関節炎、関節リウマチ、筋肉リウマチ、五十肩、肩こり

## [用法及び用量]

通常、成人1日4.5gを3回に分割し、食前又は食間に経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。

## [使用上の注意]

## (1) 慎重投与(次の患者には慎重に投与すること)

- 1) 体力の充実している患者〔副作用があらわれやすくなり、その症状が増強されるおそれがある。〕
- 2) 暑がり、のぼせが強く、赤ら顔の患者〔心悸亢進、のぼせ、舌のしびれ、悪心等があらわれるおそれがある。〕

## (2) 重要な基本的注意

- 1) 本剤の使用にあたっては、患者の証(体質・症状)を考慮して投与すること。なお、経過を十分に観察し、症状・所見の改善が認められない場合には、継続投与を避けること。

- 2) 本剤にはカンゾウが含まれているので、血清カリウム値や血圧値等に十分留意し、異常が認められた場合には投与を中止すること。
- 3) 他の漢方製剤等を併用する場合は、含有生薬の重複に注意すること。  
ブシを含む製剤との併用には、特に注意すること。

## (3) 相互作用

併用注意(併用に注意すること)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
①カンゾウ含有製剤 ②グリチルリチン酸及びその塩類を含有する製剤 ③ループ系利尿剤 フロセミド エタクリン酸 ④チアジド系利尿剤 トリクロルメチアジド	偽アルドステロン症があらわれやすくなる。また、低カリウム血症の結果として、ミオパチーがあらわれやすくなる。「重大な副作用」の項参照)	グリチルリチン酸及び利尿剤は尿管でのカリウム排泄促進作用があるため、血清カリウム値の低下が促進されることが考えられる。

## (4) 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していないため、発現頻度は不明である。

## 1) 重大な副作用

- ①偽アルドステロン症：低カリウム血症、血圧上昇、ナトリウム・体液の貯留、浮腫、体重増加等の偽アルドステロン症があらわれることがあるので、観察(血清カリウム値の測定等)を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、カリウム剤の投与等の適切な処置を行うこと。
- ②ミオパチー：低カリウム血症の結果としてミオパチーがあらわれることがあるので、観察を十分に行い、脱力感、四肢痙攣・麻痺等の異常が認められた場合には投与を中止し、カリウム剤の投与等の適切な処置を行うこと。

## 2) その他の副作用

	頻度不明
その他	心悸亢進、のぼせ、舌のしびれ、悪心等

## (5) 高齢者への投与

一般に高齢者では生理機能が低下しているので減量するなど注意すること。

(6) 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には投与しないことが望ましい。[本剤に含まれるブシの副作用があらわれやすくなる。]

(7) 小児等への投与

小児等には慎重に投与すること。[本剤にはブシが含まれている。]

\*\*[取扱い上の注意]

- ・直射日光を避け、湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- ・本剤は天然の生薬を原料としていますので、色や味等に多少の差異を生じることがありますが、効果に変わりありません。

[包 装]

500g

441g (1.5g×294包)

[文献請求先] (お問い合わせ先)

大杉製薬株式会社 医薬情報部

〒546-0035 大阪市東住吉区山坂1-8-6

TEL 050-3776-0358

---

製造販売元

**三和生薬株式会社** 宇都宮市平出工業団地6-1

発売元

**大杉製薬株式会社** 大阪市阿倍野区天王寺町南1-1-2