



漢方製剤

# オスギ漢方胃腸薬

(安中散エキス製剤)

第2類医薬品

服用に際して、この説明書を必ずお読みください。  
また、必要な時に、読めるように大切に保管してください。

## 特 徴

オスギ漢方胃腸薬は、安中散（あんちゅうさん）という漢方薬のエキスを飲みやすい顆粒剤にしたものです。本剤は、ほっそりとしたやせ型で腹部や内臓の筋肉が弛緩傾向にある、いわゆる弛緩性体質の人で、神経質でときどき胃やミゾオチのあたりが痛んだり、食物が胃に停滞して消化が悪いと感じたり、胸やけ、げっぷ、食欲不振、はきけなどがときどきある人の諸症状に効果があります。



### 使用上の注意



#### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の人は服用しないでください。  
生後3ヵ月未満の乳児。



#### 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - 医師の治療を受けている人。
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - 高齢者。
  - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
  - 次の症状のある人。  
むくみ
  - 次の診断を受けた人。  
高血圧、心臓病、腎臓病
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。  
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感や こわばりに加えて、脱力感、筋肉痛が あらわれ、徐々に強くなる。

- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

### 効能又は効果

体力中等度以下で、腹部は力がなくて、胃痛又は腹痛があつて、ときに胸やけや、げっぷ、胃もたれ、食欲不振、はきけ、嘔吐などを伴うものの次の諸症：

神経性胃炎、慢性胃炎、胃腸虚弱

### 用法及び用量

次の量を食前または食間に、水またはお湯で服用してください。(食間とは食後2～3時間を指します)

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
成人 (15歳以上)	1 包	3 回
15歳未満 7歳以上	$\frac{2}{3}$ 包	
7歳未満 4歳以上	$\frac{1}{2}$ 包	
4歳未満 2歳以上	$\frac{1}{3}$ 包	
2歳未満	$\frac{1}{4}$ 包	

#### <用法及び用量に関連する注意>

- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させてください。

### 成分及び分量

本剤3包(1包1.0g)中に、次の生薬から抽出された安中散エキス1.0gが含まれています。

ケイヒ(桂皮).....4g	シュクシャ(縮砂).....1g
エンゴサク(延胡索).....3g	カンゾウ(甘草).....1g
ボレイ(牡蛎).....3g	リョウキョウ(良姜).....0.5g
ウイキョウ(茴香).....1.5g	

添加物として、乳糖、トウモロコシデンプン、ステアリン酸マグネシウムを含有しています。

### 保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- 1包を分割して服用した残りは、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。

●本剤は天然の生薬を原料として製造していますので、製品の色や味等に多少の差異が生じることがあります。効果には変わりありません。

### 本剤についてのお問い合わせ先

大杉製薬株式会社 医薬情報部

〒546-0035 大阪市東住吉区山坂1-8-6

電話(06)6629-9058

受付時間 10時から17時まで(土、日、祝日を除く)

大杉製薬株式会社

大阪市阿倍野区天王寺町南1-1-2