

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に、読めるように大切に保管してください。



漢方製剤

# モリ ハイツウル

(麻杏薏甘湯エキス製剤)

第2類医薬品

## 特 徴

モリ ハイツウルは、麻杏薏甘湯（まきょうよくかんとう）という漢方薬のエキスを飲みやすい顆粒剤にしたものです。本剤は、胃腸が丈夫で、体質は普通かまたはやや体力のある人で、手足の皮膚があれたり、いぼができ、また病気になるって日が浅く、激しい痛みはあるが長く続かない神経痛、関節痛、筋肉痛に効果をあらわします。



## 使用上の注意



### してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

次の人は服用しないでください。  
生後3ヵ月未満の乳児。



### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
- (4) 胃腸の弱い人。
- (5) 発汗傾向の著しい人。
- (6) 高齢者。
- (7) 次の症状のある人。  
むくみ、排尿困難
- (8) 次の診断を受けた人。  
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。  
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## 効能又は効果

体力中等度なものの次の諸症：  
関節痛、神経痛、筋肉痛、いぼ、手足のあれ（手足の湿疹・皮膚炎）

## 用法及び用量

次の量を食前または食間に、水またはお湯で服用してください。  
（食間とは食後2～3時間を指します）

年 齢	1 回 量	1日服用回数
成人（15歳以上）	1 包	3 回
15歳未満7歳以上	$\frac{2}{3}$ 包	
7歳未満4歳以上	$\frac{1}{2}$ 包	
4歳未満2歳以上	$\frac{1}{3}$ 包	
2歳未満	$\frac{1}{4}$ 包	

### <用法及び用量に関連する注意>

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2) 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合のみ服用させてください。

## 成分及び分量

本剤3包（1包1.5g）中に、次の生薬から抽出された麻杏薏甘湯エキス1.3gが含まれています。

マオウ（麻黄）	4g	ヨクイニン（薏苡仁）	10g
キョウニン（杏仁）	3g	カンソウ（甘草）	2g

添加物として、乳糖、トウモロコシデンプン、ステアリン酸マグネシウムを含有しています。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります）
- (4) 1包を分割して服用した残りは、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。

●本剤は天然の生薬を原料として製造していますので、製品の色や味等に多少の差異が生じることがあります。効果には変わりありません。

## 本剤についてのお問い合わせ先

大杉製薬株式会社 医薬情報部  
〒546-0035 大阪市東住吉区山坂1-8-6  
電話（06）6629-9058  
受付時間 10時から17時まで（土、日、祝日を除く）

大杉製薬株式会社

大阪市阿倍野区天王寺町南1-1-2