

承認番号	(61AM)第3606号
薬価収載	1986年10月
販売開始	1986年11月

漢方製剤

三和 大柴胡去大黄湯エキス細粒

だいさい こ きょだいおうとう
(大柴胡去大黄湯)

貯法：室温保存
「取扱い上の注意」
の項参照
使用期限：容器又は外箱に表示

[組成・性状]

1) 本品1日量(9g)中、下記の大柴胡去大黄湯水製エキス5.6gを含有する。

日局 サイコ 6.0g	日局 タイソウ 3.0g
日局 ハンゲ 4.0g	日局 キジツ 2.0g
日局 オウゴン 3.0g	日局 ショウキョウ 2.0g
日局 シャクヤク 3.0g	

添加物として乳糖水和物、トウモロコシデンプン、結晶セルロース、部分アルファー化デンプン、軽質無水ケイ酸を含有する。

2) 本品は褐色の細粒で、特異な芳香を有し、味は苦い。

[効能又は効果]

胸や脇腹に圧迫感や痛みがあって下痢したり、肩こり、食欲減退などを伴うものの次の諸症

肝炎、胆嚢炎、胆石症、胃腸カタル、不眠症、肋間神経痛、動脈硬化症、高血圧症

[用法及び用量]

通常、成人1日9gを3回に分割し、食前又は食間に経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。

[使用上の注意]

(1) 慎重投与(次の患者には慎重に投与すること)

著しく体力の衰えている患者[副作用があらわれやすくなり、その症状が増強されるおそれがある。]

(2) 重要な基本的注意

1) 本剤の使用にあたっては、患者の証(体質・症状)を考慮して投与すること。なお、経過を十分に観察し、症状・所見の改善が認められない場合には、継続投与を避けること。

2) 他の漢方製剤等を併用する場合は、含有生薬の重複に注意すること。

(3) 高齢者への投与

一般に高齢者では生理機能が低下しているので減量するなど注意すること。

(4) 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

妊娠中の投与に関する安全性は確立していないので、妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。

(5) 小児等への投与

小児等に対する安全性は確立していない。[使用経験が少ない。]

**[取扱い上の注意]

- ・直射日光を避け、湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- ・本剤は天然の生薬を原料としていますので、色や味等に多少の差異を生じることがありますが、効果に変わりありません。

[包装]

500g
882g(3.0g×294包)

[文献請求先](お問い合わせ先)

大杉製薬株式会社 医薬情報部
〒546-0035 大阪市東住吉区山坂1-8-6
TEL 050-3776-0358

*製造販売元

三和生薬株式会社 栃木県宇都宮市平出工業団地6-1

発売元

大杉製薬株式会社 大阪市阿倍野区天王寺町南1-1-2