



服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に、読めるように大切に保管してください。

漢方製剤

サン・コーミン

(加味逍遙散エキス製剤)

第2類医薬品

特 徴

サン・コーミンは、加味逍遙散（かみしょうようさん）という漢方薬のエキスを飲みやすい顆粒剤にしたものです。本剤は、疲れやすくて体力のないのぼせ感がある人に適していて、肩こり、精神不安や眠れないなど、いろいろな精神神経症状、ときに便秘の傾向のある更年期障害などの病気に、おだやかですぐれた効きめをあらわします。



使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 胃腸の弱い人。
 - 高齢者。
 - 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。
 - むくみ
 - 次の診断を受けた人。
 - 高血圧、心臓病、腎臓病
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振 胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腸間膜静脈硬化症	長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれる。

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
下痢
- 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能又は効果

体力中等度以下で、のぼせ感があり、肩がこり、疲れやすく、精神不安やいらだちなどの精神神経症状、ときに便秘の傾向のあるものの次の諸症：

冷え症、虚弱体質、月経不順、月経困難、更年期障害、血の道症^注、不眠症

<効能又は効果に関連する注意>

注) 血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことである。

用法及び用量

次の量を食前または食間に、水またはお湯で服用してください。
(食間とは食後2～3時間を指します)

年 齢	1 回 量	1日服用回数
成人（15歳以上）	1包	3回
15歳未満の小児	服用しないこと	

成分及び分量

本剤3包（1包2.5g）中に、次の生薬から抽出された加味逍遙散エキス3.8gが含まれています。

トウキ（当帰）……………3g	ボタンピ（牡丹皮）……………2g
シャクヤク（芍薬）……………3g	サンシシ（山梔子）……………2g
ビャクジュツ（白朮）……………3g	カンゾウ（甘草）……………1.5g
フクリョウ（茯苓）……………3g	ショウキョウ（生姜）……………0.5g
サイコ（柴胡）……………3g	ハッカ（薄荷）……………1g

添加物として、乳糖、トウモロコシデンプン、ステアリン酸マグネシウムを含有しています。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
 - 小児の手の届かない所に保管してください。
 - 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります）
 - 1包を分割して服用した残りは、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- 本剤は天然の生薬を原料として製造していますので、製品の色や味等に多少の差異が生じることがあります。効果には変わりありません。

本剤についてのお問い合わせ先

大杉製薬株式会社 医薬情報部
〒546-0035 大阪市東住吉区山坂1-8-6
電話（06）6629-9058
受付時間 10時から17時まで（土、日、祝日を除く）

大杉製薬株式会社

大阪市阿倍野区天王寺町南1-1-2